

核准日期：2006年03月02日

人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【禁忌与慎用】

通用名称：人免疫球蛋白

【规格】

英文名称：Human Immunoglobulin

300ml

汉语拼音：Ren-Mian-Yue-Qiu-Dan

【成份】

【用法

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆，

用法

经低温乙醇蛋白分离法与层析法分离纯化，并经

剂量

测定(6.24g/l)和最大活量测定(0.5IU/ml)测定

剂量

制成。含适量甘氨酸缓冲剂，不含防腐剂和其他

剂量

【性状】

应为无色或淡黄色澄明液体，可带

絮状

【适应症】

尚待积累和完整不良反应的监测资料。少数人会出现

过敏反应等不良反应，无特殊禁忌，可自行

田

本品含有牛血清蛋白，可引起过敏反应。

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【禁忌与慎用】

通用名称：人免疫球蛋白

【规格】

英文名称：Human Immunoglobulin

300ml

汉语拼音：Ren-Mian-Yue-Qiu-Dan

【成份】

【用法

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆，

用法

经低温乙醇蛋白分离法与层析法分离纯化，并经

剂量

测定(6.24g/l)和最大活量测定(0.5IU/ml)测定

剂量

制成。含适量甘氨酸缓冲剂，不含防腐剂和其他

剂量

【性状】

应为无色或淡黄色澄明液体，可带

絮状

【适应症】

尚待积累和完整不良反应的监测资料。少数人会出现

过敏反应等不良反应，无特殊禁忌，可自行

10% (10%, 3ml)

【用法

只限于肌肉注射，不得用于静脉输注。

【用法

预防：为预防疾病或减轻症状，可在与麻疹感

染7日内按每毫升体重注射D.05~D.15ml，5岁以

下儿童每毫升0.5~1.0ml，6岁儿童以上儿童注射剂量不

超过6ml。一次注射预防效果通常为2~4周。

【不良反应】

【不良反应】

尚待积累和完整不良反应的监测资料。少数人会出现

过敏反应等不良反应，无特殊禁忌，可自行

【禁忌】

对免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。
IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细菌和病毒，因此免疫球蛋白制品对预防细菌、病毒性感染有一定的作用。

毒理研究尚不清楚。

1. 对
2. 有

【注意事项】

运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【包装】

每瓶含免疫球蛋白 1瓶/盒

【田注田号】

36个月

HYBS00252013

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》2025年版三部

【参考文献】

【批准文号】

3021：300mg/瓶

国药准字S2006

20：150mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可能会对本品产生相互作用。

国药准字S200630

【药品上市许可持有

博晖生物制药(河北)有限公司

【药物过量】

博晖生物

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼痛感。

【生产企业

企业名称

博晖生物制药(河北)有限公司

【药理毒

便之 电话号码：0311-83935518

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受... 从低或于免疫状态很快达到暂时免疫保护